





目錄

01
簡介

03
兒科專科疾病
診斷及治療

04
嬰幼兒身心發
展及成長保健
計劃

05
緊急分娩到診服
務及初生嬰兒住
院巡房服務

06
兒科急診及私家
醫院入院安排

07
兒童疫苗諮詢
及接種服務

14
兒科腦科專科
服務及腦電圖

11
兒童過敏症及
敏感測試

16
兒童內分泌及生
長發育評估服務

17
遙距醫療系統
及診症服務

15
兒童睡眠窒息症
檢查及睡眠測試

19
小兒外科
服務

18
兒童智力發展評
估及行為心理情
緒治療服務





匯兒作為一個兒科醫務中心，我們致力為不同成長發展階段的兒童提供全面及一站式的兒科服務。

我們的專業團隊由兒科專科醫生，多位具兒童發展評估、兒童情緒行為及心理治療經驗的專業人士以及牙科醫生組成，為家長及早辨識及處理兒童於成長期間出現的各種問題。





兒科專科醫生諮詢流程

身高、體重和頭圍量度

01

跟進以往健康問題

02

身體健康諮詢

03


全面兒科身體檢查

(心肺、腹部、手腳和神經系統、營養、皮膚、基本眼睛、耳朵和口腔檢查)

04

疫苗諮詢

05



初步篩查

兒童智力發展及行為和情緒問題

若有懷疑潛在不良發展的傾向性，個案可安排轉介到兒童心理健康及發展評估中心作詳細的評估及檢測

如有需要可做血液檢查 (額外收費項目)

- 鈣、鐵、鋅、鈉、鎂
- 血色素、白血球、血小板
- 肝臟、腎臟功能、地中海貧血、G6PD 等



嬰幼兒身心發展及成長保健計劃


匯兒兒科專科醫生團隊會定期為不同成長階段的嬰幼兒提供全面性的身心健康成長發展檢查，以及為嬰幼兒及學童提供疫苗注射服務。

服務如下：



由於寶寶的各項生理機能未發育完全，建議接種疫苗前諮詢專業的兒科醫生。

除先作身體成長檢查外，兒科醫生亦會為家長提供照顧嬰兒的護理及醫學知識，從而協助父母減低照顧嬰兒不必要的疑慮及有效地保障子女能健康成長發育。





緊急分娩到診服務及 初生嬰兒住院巡房服務



匯兒團隊的兒科專科醫生會：

為剛出生的嬰兒提供住院巡房服務



於產婦分娩時提供緊急到診服務



準媽媽已為寶寶選擇了兒科醫生？

於產檢時可預先通知婦產科醫生



或於入院登記時通知醫院產房護士



父母若希望分娩後自行選擇兒科醫生到私家醫院為初生嬰兒診症，可預先致電匯兒兒科醫務中心聯絡。






兒科急診及私家醫院入院安排

匯兒團隊的兒科專科醫生同時會提供
兒科急診及私家醫院住院安排



到診醫院名單包括：





兒童疫苗諮詢及接種服務



兒童疫苗種類:

- ACWY 四價腦膜炎雙球菌結合疫苗
- B型腦膜炎雙球菌結合疫苗
- 日本腦炎疫苗
- 13價肺炎球菌疫苗
- 口服輪狀病毒疫苗
- MMRV 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹、水痘混合疫苗
- 甲型肝炎疫苗
- 乙型肝炎疫苗
- HPV人類乳頭瘤病毒疫苗
- 六合一疫苗包括：百日咳，白喉，破傷風，小兒麻痺疫苗，乙型流感嗜血桿菌，乙型肝炎
- 五合一疫苗包括：百日咳，白喉，破傷風，小兒麻痺疫苗，乙型流感嗜血桿菌
- 四合一疫苗包括：百日咳，白喉，破傷風，小兒麻痺疫苗
- 三合一疫苗包括：百日咳，白喉，破傷風



兒童疫苗計劃 Child Vaccination Scheme

香港政府接種疫苗計劃	年歲	皇冠鑽石級 Crown
1) 卡介苗 (BCG) 2) 乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B) – 第1次	初生	
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B) – 第2次	一個月	
四合一疫苗 (DTap-IPV) 第1次 13價肺炎球菌疫苗 (PCV13) – 第1次	6–8星期	六合一疫苗– 第1次、13價肺炎
	3個月	四價腦膜炎雙球菌結合疫苗 (ACWY) B型腦膜炎雙球菌結合疫苗 (Bexsero)
四合一疫苗 (DTap-IPV) – 第2次 13價肺炎球菌疫苗 (PCV13) – 第2次	4個月	五合一疫苗、13價肺炎球菌疫苗
	5個月	四價腦膜炎雙球菌結合疫苗 (ACWY) B型腦膜炎雙球菌結合疫苗 (Bexsero)
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B) – 第3次 四合一疫苗 (DTap-IPV) – 第3次	6個月	六合一疫苗– 第3次 口服輪狀病毒疫苗 – 第3劑 (Rotateq)
	8個月	
	9個月	日本腦炎疫苗–第1針
麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 (MMR) – 第1次 13價肺炎球菌疫苗 (PCV13) – 加強劑 水痘疫苗 (Varicella)– 第1次	1歲	4痘疫苗, M
	13–15個月	四價腦膜炎雙球菌結合疫苗 (ACWY) B型腦膜炎雙球菌結合疫苗 (Bexsero)
四合一疫苗 (DTap-IPV) – 加強劑【麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹、水痘混合疫苗(4痘疫苗, MMRV)】第2次	18個月	五合一疫苗 – 加強劑和
	2歲	甲型肝炎疫苗 – 第1針 日本腦炎疫苗–第2針
	30個月	甲型肝炎疫苗 – 第2針

最全面保障 不需要到母嬰健康院

Diamond 1

皇冠鑽石級 Crown Diamond 2

球菌疫苗 – 第1次 和 口服輪狀病毒疫苗 – 第1劑 (Rotarix / Rotateq)

Nimenrix – 第1針
– 第1針

– 第2次 和 口服輪狀病毒疫苗 – 第2劑 (Rotarix / Rotateq)

Nimenrix – 第2針
– 第2針

六合一疫苗 – 第3次

B型腦膜炎雙球菌結合疫苗 (Bexsero) – 第1針

口服輪狀病毒疫苗 – 第3劑 (Rotateq)

B型腦膜炎雙球菌結合疫苗 (Bexsero) – 第2針

日本腦炎疫苗 – 第1針

四價腦膜炎雙球菌結合疫苗 (ACWY) Menactra/Nimenrix – 第1針

MRV第1次 和 13價肺炎球菌疫苗 – 加強劑

Nimenrix – 第3針
– 第3針

甲型肝炎疫苗 – 第1針

四價腦膜炎雙球菌結合疫苗(ACWY) Menactra/Nimenrix – 第2針

B型腦膜炎雙球菌結合疫苗 (Bexsero) – 第3針

4痘疫苗 MMRV 第2次

甲型肝炎疫苗 – 第2針

日本腦炎疫苗 – 第2針

2 敏感測試

過敏症是指身體對某種物質出現過敏反應，從而引起不同症狀。

過敏反應可分為急性及慢性兩種：

(1) 急性過敏反應可於數分鐘至1小時內出現

輕微症狀包括皮膚痕癢、蕁麻疹（俗稱風癩）；嚴重更可出現過敏性休克，病人會即時出現嘴唇、咽喉紅腫、皮膚嚴重的痕癢及紅腫，繼而感到呼吸困難、氣管收窄，更可能血壓下降而引起生命危險，需立刻送院治療。



(2) 慢性過敏反應可於數小時或數天後發生

- 疾病包括過敏性皮膚炎（濕疹）、過敏性鼻炎（鼻敏感）、過敏性結膜炎、接觸性皮膚炎、蕁麻疹（風癩）、過敏性氣管炎（哮喘）等。
- 若曾出現嚴重過敏反應、或經常受過敏性疾病所困擾的小朋友可以考慮接受過敏測試（包括皮膚點刺、血液測試）。
- 藉著檢測出致敏原，能更了解及改善自己的過敏狀況，作出預防過敏及改善病情的方案。



(3) 濕疹

- 在多種慢性過敏反應中，「濕疹」是在嬰幼兒中最常見和受父母關注。「濕疹」又稱為異位性皮炎，是一種非常普遍的慢性皮膚病但沒有傳染性。在香港大約有3-5%五歲以下兒童受到影響。約有三份二的患者有個人或家族性的敏感疾病。濕疹的成因多樣，遺傳是其中之一，其他常見的致敏原例如塵蟎、動物皮毛、衣物、家居環境、空氣污染等都可以誘發濕疹。
- 常見症狀包括皮膚乾燥、發紅、痕癢，以及有發炎的情況。由於這疾病是漫長的，患者一般會重覆發作，



如果病情反覆，長遠皮膚可能會變得深色和變厚。

- 根據多項國際性研究，平均有35%至40%的濕疹病童同時患有食物過敏。而被證實患有食物過敏的濕疹病童中，其中 $\frac{3}{4}$ 可能對牛奶、雞蛋、花生、黃豆或小麥產生不良反應。
- 現時濕疹是沒有根治(斷尾)的方案，但可以透過藥物和生活細節來


皮膚點刺測試 (Skin Prick Test)

- 將少量致敏原液體刺入皮膚表層，若對致敏原過敏，會在15至20分鐘後會出現紅腫反應。嬰幼兒也可以接受檢查，一般進行位置在背部或手臂上。
- 此方法既安全及靈敏度高，而且可以即時知道檢測結果。進行測試前，需停服抗組織胺藥物七天。



血液過敏測試

- IgE免疫球蛋白E是一種廣泛應用的過敏測試。近年IgE過敏測試亦發展為測試證實會引起過敏反應的蛋白質分子（過敏原分子），除準確度提高外，亦能降低假陽性機會。
- 以花生敏感為例，若果測試出對Ara h1, h2, h3或h6呈陽性反應的話，則表示病人有機會因進食花生而出現過敏性休克，需避免進食花生，以及建議患者裝備過敏急救筆以備不時之需。但假若只對Ara h8呈陽性反應的話便不用擔心。醫生亦可以結合病人臨床病徵及測試結果以制定治療方向，而舌下脫敏治療亦開始被廣泛使用。



最新一代IgE過敏測試 (Faber Test)

最新一代的 FABER 過敏測試結合分子技術和納米技術來進行多重檢測特異性免疫球蛋白(IgE)，測試直接引起過敏反應的致敏原分子，大大提高測試的準確性。而且，測試244種致敏原分子和提取物，僅需要使用3-5毫升血液。



只需3-5毫升血液



測試不受藥物影響



全面超過150種致敏原



歐盟 (IVD) 認可的過敏測試



樣本由意大利團隊進行測試及分析



大約10- 20個工作日內完成報告

舌下脫敏治療

(Sublingual Immunotherapy, SLIT)

舌下脫敏治療是將一種含有致敏原的溶液放於舌底下含服，令患者體內逐漸建立針對對抗那種致敏原的免疫能力，使患者即使接觸同類致敏原時，所產生的過敏反應大大減弱，從而改善過敏症狀。



- 舌下脫敏治療適合三歲以上的小童及成人使用，以治療針對因對貓、狗及塵蟎過敏的情況。
- 相對於注射式脫敏治療，舌下脫敏治療較少副作用，最常見副作用包括服藥後口腔痕癢或紅腫。
- 如有需要，醫生會安排病人服用抗組織胺藥物以減輕副作用。
- 多個小童參與之大型研究均未發現任何嚴重反應，而患者亦甚少因嚴重副作用而終止治療。
- 治療時間一般需要連續每天使用三年，大約6-9個月左右病徵會明顯改善。亦有研究顯示治療三年後十年內並沒有再復發。世界衛生組織建議可用於過敏性疾病如過敏性鼻炎、哮喘、眼睛敏感及皮膚敏感等。



小兒腦神經系統疾病範圍廣泛，當中包括腦癇病、先天性腦神經異常、腦性麻痺、偏頭痛、抽動症、與基因或染色體有關的腦神經疾病、新陳代謝性異常、貯積性疾病等等。尤以腦癇病，俗稱癲癇症較常見。

腦癇病 (Epilepsy) 的病因大多數不明顯，特別是早期發病患者可能跟遺傳因子有關。其他成因包括先天性感感染、出生時難產引致腦部缺氧或損傷、腦炎、腦膜炎、腦腫瘤或新陳代謝異常等問題。發病主要因為腦神經細胞異常放電，從而引起陣發的短暫大腦神經功能紊亂。腦癇病可分類為全腦性及局部性腦癇。除臨床診斷外，腦電圖檢查 (Electroencephalogram, EEG) 可協助分類及診斷腦癇病。如患者發病頻密便需服用抗腦癇藥去控制病情。腦電圖檢查亦可在本中心進行，由小兒腦科醫生分析數據及撰寫報告。

抽動症 (Provisional tic disorder) 大致分為兩類型：1) 運動型 2) 發聲型。大約百份之二至五之小童有這情況。常見模式為眼眨，頸部抽動或喉部發出聲響。抽動症的特質是可短暫壓抑和不會在睡眠時發生。抽動症是臨床診斷。醫生會因應病童情況而決定用藥與否，或轉介臨床心理學家或兒童精神科醫生跟進。



嬰幼兒睡眠問題： 兒童睡眠窒息症檢查及睡眠測試

兒童睡眠時出現鼻鼾的情況頗為常見，當中每一百個兒童就有十至十五個有持續性鼻鼾，但每四個有持續性鼻鼾的兒童之中，就有一個患有兒童睡眠窒息症 (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS)。發病主要因為上呼吸道於睡眠時受阻，以至空氣不能順利通過呼吸管道而致窒息情況出現，一般常見於扁桃腺肥大、肥胖、下顎細、頸短及患有嚴重鼻敏感的兒童。

小朋友患上睡眠窒息症影響可大可小



生長高度
(體型瘦小)



腦部智力及
情緒發展



容易疲倦



影響吸收知
識的黃金期



腦部智力及
情緒發展



導致高血壓

患有睡眠窒息症的兒童有別於成年人，日間沒有明顯的睏睡情況。不過因為睡眠質素受影響而往往出現專注力缺乏，學習困難以及行為問題。

若擔心孩子睡眠問題，可安排睡眠測試 (Polysomnography) 以判斷孩子是否患有睡眠窒息症。



兒童內分泌及生長發育評估服務

服務範圍



兒童矮小症
及生長激素
治療



性早熟或
晚熟



男性女乳症



甲狀腺功能
異常 (例如
甲亢)



先天性甲
狀腺低功
能症





遙距醫療系統及診症服務



遙距醫療系統 7 步曲

1



預約

2



線上提交
及簽署相關
文件

3



線上支付診
症費用

4



確認服務、
日期及時間

5



於約定時
間，安坐家
中進行問診

6



線上支付藥
物費用

7




於約定時
間，安坐家
中接收藥物



兒童智力發展評估及行為 心理情緒治療服務

診斷範圍



整體發展遲緩



自閉症譜系或
社交溝通障礙



語言發展
遲緩



專注力失調及
過度活躍症



兒童及青少年行
為或情緒問題
(焦慮症、情緒控制
等)



大、小肌肉協
調障礙



特殊學習障礙
或讀寫障礙



睡眠或飲
食問題



兒童資優或智
能評估



小兒外科服務

在兒童成長過程中，少不免也會生病。而小朋友的疾病是多樣化的，兒科醫生會為小朋友的健康狀況作出專業評估，為有需要的個案轉介到其他有豐富兒科經驗的外科醫生團隊跟進。我們的兒童外科團隊包括：小兒外科、小兒骨科、兒童脊醫和兒童耳鼻喉科等。

小兒外科所提供的主要手術

包皮環切
手術
(俗稱割
包皮)

腹股溝疝
手術
(俗稱小腸氣)

鞘膜積液
(俗稱陰囊積水)
修補

隱睪丸
修補

臍疝
修補

舌繫帶
釋放術
(俗稱剪脷根)

*歡迎查詢更多小兒外科手術服務



小兒骨科疾病及脊柱矯正服務

骨骼創傷、
骨折



斜頸



馬蹄足
內翻



先天性髖關
節脫位



先天性
骨骼缺憾、
長短腳、
弓型腿



脊柱
側彎及其他
腰背
問題



兒童耳鼻喉所提供的服務

耳鏡、
喉鏡檢查



清理堵塞耳
道的耳垢



植入耳道通
氣管治療中
耳積水



修補
耳膜



治療
急性和慢性
鼻竇炎



扁桃腺
切除手術





☎ 2156 5850

L41, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street,
Mongkok, Kln
九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓41樓

☎ 2323 8881 / 2323 8923

Suite 1214-15, 12/F, Ocean Centre, 5 Canton Rd,
Tsim Sha Tsui, Kln
九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心12 樓1214 – 15 室

☎ 2323 8633 / 2323 8881

Suite 1404-05, 14/F, Ocean Centre, 5 Canton Rd,
Tsim Sha Tsui, Kln
九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心14 樓1404 – 05 室



☎ 2156 5849

L41, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street,
Mongkok, Kln
九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓41樓



www.primecare.com.hk



[@primecare.hongkong](https://www.facebook.com/primecare.hongkong)